

32002L0079

28.10.2002

DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

L 291/1

DYREKTYWA KOMISJI 2002/79/WE**z dnia 2 października 2002 r.****zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. odnoszącą się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni⁽¹⁾, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2002/71/WE⁽²⁾, w szczególności jej art. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni⁽³⁾, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2002/76/WE⁽⁴⁾, w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni⁽⁵⁾, ostatnio zmienioną dyrektywą 2002/71/WE, w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni⁽⁶⁾, ostatnio zmienioną dyrektywą 2002/76/WE, w szczególności jej art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Załączniki do dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG składają się z wykazów pozostałości pestycydów i ich najwyższych dopuszczalnych poziomów.
- (2) Po ponownym zbadaniu dostępnych danych uznano, że istnieją dostateczne dane pozwalające na ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości

(NDPP) niektórych pestycydów, to jest abamektyny, azocyklotyny, bioresmetryny, bifentyny, bitertanolu, bromopropylatu, kłofentezyny, cyromazyny, cyheksatyny, fenpropimorfu, flucytrynatu, heksakonazolu, meta-kryfosu, mychlobutanilu, penkonazolu, prochlorazu, profenofosu, resmetryny, tridemorfu, triadimefonu i triadimenolu.

- (3) Obecność pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia zwierzęcego może być skutkiem praktyk stosowanych w rolnictwie. Konieczne jest uwzględnienie odpowiednich danych, których źródłem jest zarówno dozwolone stosowanie pestycydów, jak i prowadzone pod nadzorem próby oraz badania dotyczące karmienia zwierząt.

- (4) Przeanalizowano dostępne informacje. W odniesieniu do wielu połączeń pestycydów z produktami rolnymi posiadane dane pozwalają na obliczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości (NDPP) danego pestycydu, który można uznać za bezpieczny dla ludzkiego zdrowia. W przypadku gdy obliczony poziom przewyższa niższy próg oznaczenia analitycznego, najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości należy ustalić na obliczonym poziomie. W odniesieniu do niektórych zestawień dostępne informacje są niewystarczające i w takich przypadkach należy ustalić najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości na poziomie niższego progu oznaczenia analitycznego. W odniesieniu do innych pozycji posiadane informacje są wystarczające, lecz wskazują, że ustalenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości powyżej niższego progu oznaczenia analitycznego może powodować niedopuszczalne, ostre lub przewlekłe narażenie konsumentów na działanie pozostałości. W takich przypadkach najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości należy ustalić na niższym progu oznaczenia analitycznego.

⁽¹⁾ Dz.U. L 340 z 9.12.1976, str. 26.⁽²⁾ Dz.U. L 225 z 22.8.2002, str. 21.⁽³⁾ Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37.⁽⁴⁾ Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 45.⁽⁵⁾ Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43.⁽⁶⁾ Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71.

(5) Długotrwałe narażenie, jak również ostre narażenie konsumentów na te pestycydy zostało ocenione i obliczone zgodnie ze wspólnotowymi procedurami i praktykami, z uwzględnieniem wytycznych opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia ⁽¹⁾. Dla abamektyny maksymalny limit pozostałości ustanowiono zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2377/90 ⁽²⁾, ostatnio zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1752/2002 ⁽³⁾, w związku ze stosowaniem weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających tę samą substancję w leczeniu gatunków zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności (rozporządzenie Komisji (WE) nr 3425/93) ⁽⁴⁾. Zastosowania te oraz obliczenie dopuszczalnego spożycia dziennego, przedstawione przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, na których oparto te maksymalne limity pozostałości, zostały wzięte pod uwagę. Wnioskuje się, że najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości proponowany w niniejszej dyrektywie nie doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnego spożycia dziennego ani do ostrych efektów toksycznych.

(6) W celu zapewnienia konsumentowi odpowiedniej ochrony przed narażeniem na pozostałości w produktach bądź na powierzchni produktów, które nie zostały dopuszczone do obrotu, rozsądne jest określenie tymczasowego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości w oparciu o niższy próg oznaczenia analitycznego w odniesieniu do wszystkich takich produktów objętych dyrektywami 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG.

(7) W związku z tym należy wprowadzić zmiany do załączników do dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG.

(8) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzone zostały konsultacje z partnerami handlowymi Wspólnoty w sprawie poziomów proponowanych w niniejszej dyrektywie, ich uwagi zostały rozważone.

⁽¹⁾ Wytyczne dotyczące przewidywań w odniesieniu do spożycia pozostałości pestycydów (poprawione), opracowane przez GEMS/Program Żywnościowy we współpracy z Komitetem ds. Pozostałości Pestycydów Komisji Kodeksu Żywnościowego i opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r. (SOZ/FSF/FOS/97.7).

⁽²⁾ Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1.

⁽³⁾ Dz.U. L 264 z 2.10.2002, str. 18.

⁽⁴⁾ Dz.U. L 312 z 15.12.1993, str. 12.

(9) Uwzględniono opinie Komitetu Naukowego ds. Roślin, w szczególności rady i zalecenia dotyczące ochrony konsumentów roślinnych środków spożywczych, wobec których stosowano środki ochrony roślin ⁽⁵⁾.

(10) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do dyrektywy 76/895/EWG skreśla się pozycję odnoszącą się do „bromopropylatu”.

Artykuł 2

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG dodaje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów dla abamektyny, azocyklotyny i cyheksatyny, bifentyny, bitertanolu, bromopropylatu, kłofentezyny, cyromazyny, fenpropimorfu, flucytrynatu, heksakonazolu, metakryfosu, mychlobutanilu, penkonazolu, prochlorazu, profenofosu, resmetryny i bioresmetryny, tridemorfu, triadimefonu i triadimenolu wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

W załączniku II do dyrektywy 86/363/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a) w części A dodaje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów dla abamektyny, bifentyny, bitertanolu, bromopropylatu, cyromazyny, flucytrynatu, metakryfosu penkonazolu, prochlorazu, profenofosu, resmetryny i bioresmetryny, tridemorfu, triadimefonu i triadimenolu, wymienionych w załączniku II do niniejszej dyrektywy;

b) w części B dodaje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów dla azocyklotyny i cyheksatyny, fenpropimorfu, kłofentezyny i mychlobutanilu, wymienione w załączniku III do niniejszej dyrektywy.

⁽⁵⁾ SCP/RESI/021; SCP/RESI/024

Artykuł 4

W załączniku II do dyrektywy 90/642/EWG wprowadza się następujące zmiany:

- a) dodaje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów dla abamektyny, azocyklotyny i cyheksatyny, bifentryny, bitertanolu, bromopropylatu, kłofentezyny, cyromazyny, fenpropimorfu, flucytrynatu, heksakonazolu, metakryfosu, mychlobutanilu, penkonazolu, prochlorazu, profenofosu, resmetryny i bioresmetryny, tridemorfu, triadimenfonu i triadimenolu, wymienionych w załączniku IV do niniejszej dyrektywy;
- b) najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów dla etionu w herbacie zmienia się na 3 mg/kg.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 4 lit. b) niniejszej dyrektywy do 31 grudnia 2002 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują te przepisy ze skutkiem od 1 stycznia 2003 r.

2. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 1, 2 i 3 oraz art. 4 lit. a) do 31 maja 2003 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują te przepisy ze skutkiem od 1 sierpnia 2003 r.

3. Środki określone w ust. 1 i 2 zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określone są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 października 2002 r.

W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I

Pozostałości pestycydów	Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg
Abamektyna (suma awermektyny B1a, awermektyny B1b i izomeru delta-8,9 awermektyny B1a)	0,01 (*)
Azocyklotyna i cyheksatyna (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna)	0,05 (*)
Bifentryna	0,5 pszenica, jęczmień, owies zwyczajny, pszenżyto 0,05 (*) pozostałe zboża
Bitertanol	0,05 (*)
Bromopropylat	0,05 (*)
Kłofentezyna (suma wszystkich składników zawierających cząsteczkę 2-chloro-benzoilową w przeliczeniu na kłofentezynę)	0,02 (*)
Cyromazyna	0,05 (*)
Fenpropimorf	0,5 jęczmień, pszenica, owies zwyczajny, żyto, orkisz, pszenżyto 0,05 (*) pozostałe zboża
Flucytrynat (wyrażony jako flucytrynat, suma izomerów)	0,05 (*)
Heksakonazol	0,02 (*)
Metakryfos	0,05 (*)
Mychlobutanil	0,02 (*)
Penkonazol	0,05 (*)
Prochloraz (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6-trójfenylową przeliczoną na prochloraz)	1 owies zwyczajny, jęczmień 0,5 pszenżyto, pszenica, żyto 0,05 (*) pozostałe zboża
Profenofos	0,05 (*)
Resmetryna, łącznie z innymi mieszaninami izomerów (suma izomerów)	0,05 (*)
Tridemorf	0,2 jęczmień, owies zwyczajny 0,05 (*) pozostałe zboża
Triadimefon i triadimenol (suma triadimefonu i triadimenolu)	0,2 pszenica, jęczmień, owies zwyczajny, żyto, pszenżyto 0,1 (*) pozostałe zboża

(*) Wskazuje niższy próg oznaczenia analitycznego.

ZAŁĄCZNIK II

Pozostałości pestycydów	Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg (ppm)		
	tłuszczu zawartego w mięsie, przetworach mięsnych, podrobach i tłuszczach zwierzęcych wymienionych w załączniku I, objętych kodami CN ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 i 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	w surowym krowim mleku i pełnotłustym krowim mleku wymienionych w załączniku 1 objętych kodem CN 0401; dla pozostałych środków spożywczych objętych kodami CN 0401, 0402, 0405 00 i 0406 zgodnie z ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	w świeżych jajach bez skorupy, w ptasich jajach i żółtku jaj, wymienionych w załączniku 1 objętych kodami CN 0407 00 i 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Abamektyna (suma awermektyny B1a, awermektyny B1b i izomeru delta- 8, 9 awermektyny B1a)	0,02 wątroba wołowa (patrz rozporządzenie (WE) nr 3425/93) 0,01 (*) pozostałe produkty	0,005 (*)	0,01 (*)
Bifentryna	0,1 tłuszcz wołowy 0,05 (*) pozostałe produkty	0,01 (*)	0,01 (*)
Bitertanol	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Bromopropylat	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Flucytrynat (suma izomerów, w przeliczeniu na flucytrynat)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Metakryfos	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
Penkonazol	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Prochloraz (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6-trójfenylową, w przeliczeniu na prochloraz)	0,2 tłuszcz wołowy 2,0 wątroba wołowa 0,5 nerki wołowe 0,1 (*) pozostałe produkty	0,02 (*)	0,1 (*)
Profenofos	0,05 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
Resmetryna, łącznie z innymi mieszaninami izomerów (suma izomerów)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
Tridemorf	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

	Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg (ppm)		
	tłuszczu zawartego w mięsie, przetworach mięsnych, podrobach i tłuszczach zwierzęcych wymienionych w załączniku I, objętych kodami CN ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 i 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	w surowym krowim mleku i pełnotłustym krowim mleku wymienionych w załączniku 1 objętych kodem CN 0401; dla pozostałych środków spożywczych objętych kodami CN 0401, 0402, 0405 00 i 0406 zgodnie z ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	w świeżych jajach bez skorupy, w ptasich jajach i żółtku jaj, wymienionych w załączniku 1 objętych kodami CN 0407 00 i 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Pozostałości pestycydów			
Triadimenol i triadimefon (suma triadimenolu i triadimefonu)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)

(*) Wskazuje niższy próg oznaczenia analitycznego.

⁽¹⁾ W przypadku środków spożywczych zawierających w masie 10 % lub mniej tłuszczu pozostałość odnosi się do łącznej wagi z kością. W takich przypadkach najwyższy dopuszczalny poziom wynosi jedną dziesiątą wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, lecz nie mniej niż 0,01 mg/kg.

⁽²⁾ Przy oznaczaniu pozostałości w surowym mleku krowim i pełnotłustym mleku krowim należy przyjąć jako podstawę zawartość tłuszczu w masie wynoszącą 4 %. Dla surowego mleka i pełnotłustego mleka innych zwierząt pozostałości wyraża się na podstawie tłuszczu.

Dla pozostałych środków spożywczych wymienionych w załączniku I objętych kodami CN 0401, 0402, 0405 00 i 0406:

— o zawartości tłuszczu w masie wynoszącej mniej niż 2 % przyjmuje się najwyższy dopuszczalny poziom w wysokości połowy najwyższego dopuszczalnego poziomu ustalonego dla surowego mleka i pełnotłustego mleka,

— o zawartości tłuszczu w masie wynoszącej 2 % lub więcej najwyższy dopuszczalny poziom wyraża się w mg/kg tłuszczu. W takich przypadkach najwyższy dopuszczalny poziom jest równy 25-krotności najwyższego dopuszczalnego poziomu ustalonego dla surowego mleka i pełnotłustego mleka.

⁽³⁾ Dla jaj i produktów jajecznych o zawartości tłuszczu w masie wynoszącej więcej niż 10 % najwyższy dopuszczalny poziom wyraża się w mg/kg tłuszczu. W takim przypadku najwyższy dopuszczalny poziom jest równy 10-krotności najwyższego dopuszczalnego poziomu ustalonego dla świeżych jaj.

⁽⁴⁾ Postanowień przypisów 1, 2 i 3 nie stosuje się, w przypadku gdy wskazany jest niższy próg oznaczenia analitycznego.

ZAŁĄCZNIK III

Pozostałości pestycydów	Najwyższe dopuszczalne poziomy w mg/kg (ppm)		
	w mięsie łącznie z tłuszczem, przetworach z mięsa, podrobach i tłuszczach zwierzęcych wymienionych w załączniku I objętych kodami CN ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 i 1602	w mleku i produktach mlecznych wymienionych na liście stanowiącej załącznik 1 objętych kodami CN 0401, 0402, 0405 00 i 0406	w świeżych jajach bez skorup, w ptasich jajach i żółtkach jaj wymienionych w załączniku 1 objętych kodami CN 0407 00 i 0408
Azocyklotyna i cyheksatyna (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna)	0,2 mięso wołowe 0,05 (*) pozostałe produkty	0,05 (*)	0,05 (*)
Fenpropimorf kwas karboksylowy (BF 421-2) wyrażony jako fenpropimorf	0,3 wątroba wołowa, kozia, wieprzowa i owcza 0,05 nerki wołowe, kozie, wieprzowe i owcze 0,01 (*) mięso drobiowe, tłuszcz, jadalne podroby 0,02 mięso wołowe, kozie, wieprzowe i owcze 0,01 pozostałe produkty	0,01	0,01 (*)
Cyromazyna	0,05 (*) wszystkie produkty za wyjątkiem owiec	0,02 (*)	0,2
Klofentezyna (suma wszystkich składników zawierających cząsteczkę 2-chlorobenzoilową w przeliczeniu na klofentezynę)	0,1 wątroba wołowa, owcza i kozia 0,05 (*) pozostałe produkty	0,05 (*)	0,02 (*)
Alfa-(3-hydroksybutyl)-alfa-(4-chlorofenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-propannitril (RH9090) wyrażony jako mychlobutanil	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Wskazuje niższy próg oznaczenia analitycznego.

ZAŁĄCZNIK IV

POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW I NDPP (mg/kg)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których mają zastosowanie NDPP	Abamektyna (suma awermektyny B1a, awermektyny B1b i izomeru delta-8,9 awermektyny B1a)	Azocyklotyna i cyheksatyna (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna)	Bifentryna	Bitertanol	Bromopropylat	Klofentezyna
1. Owoce świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez mrożenie, niezawierające dodatku cukru; orzechy					0,05 (*)	
i) OWOCE CYTRUSOWE	0,01 (*)	0,2	0,1	0,05 (*)		0,02 (*)
Grejpfruty						
Cytryny						
Limy						
Mandarynki (łącznie z klementynkami i innymi hybridami)						
Pomarańcze						
Pomele						
Pozostałe						
ii) ORZECZY (łuskane i niełuskane)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,05 (*)
Migdały						
Orzechy brazylijskie						
Orzechy nerkowca						
Kasztany jadalne						
Orzechy kokosowe						
Orzechy laskowe						
Orzechy makadamia						
Orzeszki pekan						
Orzeszki sosnowe						
Pistacje						
Orzechy włoskie						
Pozostałe						
iii) OWOCE ZIARNKOWE	0,01 (*)		0,3	2		0,5
Jabłka		0,2				
Gruszki		0,1				
Pigwy						
Pozostałe		0,05 (*)				

	Cyromazyna	Fenpropi-morf	Flucytrynat	Heksakona-zol	Metakryfos	Mychlobu-tanil	Penkonazol	Prochloraz (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierają-cych cząsteczkę 2,4,6-trójfenyłowa przeliczona na prochloraz)	Profenofos	Resmetryna, łącznie z innymi miesza-niami izomerów (suma izomerów)	Tridemorf	Triadimefon i triadimenol (suma triadimefonu i triadimenolu)
	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	3	0,05 (*)	10	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,5 (*)	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,2 0,1 (*)

Cyromazyna	Fenpropimorf	Flucytrynat	Heksakonazol	Metakryfos	Mychlobutanil	Penkonazol	Prochloraz (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6-trójfenyłową przeliczoną na prochloraz)	Profenofos	Resmetryna, łącznie z innymi mieszaninami izomerów (suma izomerów)	Tridemorf	Triadimefon i triadimenol (suma triadimefonu i triadimenolu)
0,05 (*)	0,05 (*)				0,3 1 0,5 0,5 0,02 (*)	0,1 0,1 0,05 (*)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0,05 (*)	0,05 (*)				1	0,2	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	2
	1				1 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)					0,5 0,1 (*)
1 0,05 (*)							0,05 (*)				0,1 (*)
0,05 (*)					1 1 0,02 (*) 0,02 (*)	0,05 (*) 0,05 (*)	0,05 (*)				0,1 (*)
	2				2		5		0,1 (*)	0,05 (*)	0,2 (*)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których mają zastosowanie NDPP	Abamektyna (suma awermek- tyny B1a, awermek- tyny B1b i izomeru delta-8,9 awermek- tyny B 1a)	Azocyklotyn a i cyheksatyna (suma azocyklo- tyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna)	Bifentryna	Bitertanol	Bromopro- pylat	Klofentezyna
Liczi						
Mango						
Oliwki						
Owoce męczennicy						
Ananasy						
Papaje						
Pozostałe			0,05 (*)	0,05 (*)		
2. Warzywa świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone					0,05 (*)	
i) WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Burak						
Marchew						
Seler						
Chrzan						
Karczochy jerozolimskie						
Pasternak						
Pietruszka – korzeń						
Rzodkiewka						
Salsefia						
Słodkie ziemniaki						
Brukiew						
Rzepa						
Ignam						
Pozostałe						
ii) WARZYWA CEBULOWE	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Czosnek						
Cebula						
Szalotka						
Dymka						
Pozostałe						

	Cyromazyna	Fenpropimorf	Flucytrynat	Heksakonazol	Metakryfos	Mychlobutanil	Penkonazol	Prochloraz (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6-trójfenylowa przeliczona na prochloraz)	Profenofos	Resmetryna, łącznie z innymi mieszaninami izomerów (suma izomerów)	Tridemorf	Triadimefon i triadimenol (suma triadimefonu i triadimenolu)
								5				
		0,05 (*)				0,02 (*)		5				3
								5				
								0,05 (*)				0,1 (*)
	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
						0,2						
						0,02 (*)						
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)	
								0,5				0,5
								5				1
								0,05 (*)				0,1 (*)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których mają zastosowanie NDPP	Abamektyna (suma awermektyny B1a, awermektyny B1b i izomeru delta-8,9 awermektyny B1a)	Azocyklotyna i cyheksatyna (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna)	Bifentryna	Bitertanol	Bromopropylat	Klofentezyna
iii) WARZYWA OWOCOWE						
a) Rośliny psiankowate (<i>Solanaceae</i>)		0,05 (*)				
Pomidory	0,02		0,2	3		0,3
Papryka	0,05		0,2			
Chili						
Oberżyny	0,02		0,2			
Pozostałe	0,01 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
b) Dyniowate z jadalną skórą	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1	0,5		0,02 (*)
Ogórki						
Korniszony						
Cukinie						
Pozostałe						
c) Dyniowate z niejadalną skórą	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
Melony						0,1
Kabaczki						
Arbuzy						
Pozostałe						0,02 (*)
d) Kukurydza cukrowa	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
iv) WARZYWA KAPUSTNE	0,01 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
a) Warzywa kapustne kwiatostanowe			0,2			
Brokuł (łącznie z brokułami włoskimi)						
Kalafior						
Pozostałe						
b) Warzywa kapustne głowiaste			1			
Brukselka						
Kapusta głowiasta						
Pozostałe						
c) Warzywa kapustne liściowe			0,05 (*)			
Kapusta chińska						
Jarmuż						
Pozostałe						

[illegible]

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których mają zastosowanie NDPP	Abamektyna (suma awermek- tyny B1a, awermek- tyny B1b i izomeru delta-8,9 awermek- tyny B1a)	Azocyklo- tyna i cyheksatyna (suma azocyklo- tyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna)	Bifentryna	Bitertanol	Bromopro- pylat	Klofentezyna
d) Kalarepa			0,05 (*)			
v) WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA		0,05 (*)		0,05 (*)		0,02 (*)
a) Sałata i inne	0,1		2			
Rzeżucha						
Roszonka warzywna						
Sałata						
Cykoria liściowa						
Pozostałe						
b) Szpinak i inne	0,01 (*)		0,05 (*)			
Szpinak						
Burak liściowy (boćwina)						
Pozostałe						
c) Rukiew wodna	0,01 (*)		0,05 (*)			
d) Endywia	0,01 (*)		0,05 (*)			
e) Zioła	0,01 (*)		0,05 (*)			
Trybula						
Szczypiorek						
Pietruszka naciowa						
Seler naciowy						
Pozostałe						
vi) WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)	0,01 (*)			0,05 (*)		0,02 (*)
Fasola (niełuskana)		0,5	0,5			
Fasola (łuskana)						
Groch (niełuskany)			0,1			
Groch (łuskany)						
Pozostałe		0,05 (*)	0,05 (*)			
vii) WARZYWA ŁODYGOWE (świeże)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
Szparagi						
Karczochy						
Seler						

	Cyromazyna	Fenpropimorf	Flucytrynat	Heksakonazol	Metakryfos	Mychlobutanil	Penkonazol	Prochloraz (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6-trójfenylowa przeliczoną na prochloraz)	Profenofos	Resmetryna, łącznie z innymi mieszaninami izomerów c (suma izomerów)	Tridemorf	Triadimefon i triadimenol (suma triadimefonu i triadimenolu)
15		0,05 (*) 0,05 (*)						5	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
	0,05 (*)							0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 5				
	0,05 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)
2								0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których mają zastosowanie NDPP	Abamektyna (suma awermektyny B1a, awermektyny B1b i izomeru delta-8,9 awermektyny B1a)	Azocyklotyna i cyheksatyna (suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna)	Bifentryna	Bitertanol	Bromopropylat	Klofentezyna
Koper						
Karczochy kuliste						
Por						
Rabarbar						
Pozostałe						
viii) GRZYBY	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)
a) Grzyby hodowlana						
b) Grzyby dziko rosnące						
3. Nasiona roślin strączkowych	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Fasola						
Soczewica						
Groch						
Pozostałe						
4. Nasiona roślin oleistych	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
Nasiona lnu						
Orzeszki ziemne						
Ziarna maku						
Ziarna sezamu						
Ziarna słonecznika						
Nasiona rzepaku						
Ziarna soi						
Ziarna gorczycy						
Nasiona bawełny						
Pozostałe						
5. Ziemniaki	0,01 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Ziemniaki wczesne i ziemniaki konsumpcyjne						
6. Herbata (liście i łodygi, suszone, fermentowane lub w inny sposób przetwarzane części rośliny <i>Camellia sinensis</i>)	0,02 (*)	0,1 (*)	5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. Chmiel (suszony), łącznie z szyszkami chmielu i nie skoncentrowanym proszkiem	0,05	0,1 (*)	10	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)

(*) Wskazuje niższy próg oznaczenia analitycznego.

	Cyromazyna	Fenpropimorf	Flucytrynat	Heksakonazol	Metakryfos	Mychlobutanil	Penkonazol	Prochloraz (suma – prochlorazu i jego meta- bolitów zawierają- cych cząsteczkę 2,4,6- trójfeny- lową przeliczoną na prochloraz)	Profenofos	Resmetryna łącznie z innymi mieszani- nami izomerów (suma izomerów)	Tridemorf	Triadimefon i triadimenol (suma triadime- fonu i triadime- nolu)
2		0,5				0,5	0,2					1
												0,1 (*)
0,05 (*)		0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)					0,1 (*)
		0,05 (*)				0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
5								2				
0,05 (*)								0,05 (*)				
0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
								0,3				
0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,2 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)
								0,5				
								0,5				
								0,5				
									2			
1		0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
								0,05 (*)	0,05 (*)			
0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	20	0,2 (*)
0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	2	0,5	0,1 (*)	0,1 (*)	0,2 (*)	0,1 (*)	10